

18+



РОДИТЕЛЯМ О ПРИВИВКАХ

Уважаемые родители! Вам необходимо знать, что только профилактические прививки могут защитить Вас и Вашего ребенка от серьезных заболеваний.

КОРЬ - острое вирусное инфекционное заболевание, для которого характерно острое начало с повышением температуры до 38°C и выше, обильными выделениями из носа, конъюнктивитом, кашлем, характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов. Корь – одно из самых **контагиозных (заразных)** заболеваний, **передается воздушно-капельным путем**. Заражение происходит даже при мимолетном контакте или вдыхании пыли, содержащей возбудителей. Инфекцию можно «подхватить», проехав в лифте, где находился больной. Недаром корь носит название «подъездной» болезни – удержать ее в пределах одной квартиры крайне сложно.

Опасность кори заключается в возможном развитии постинфекционных осложнений (пневмония, отит, синусит, стоматит, энцефалит, который необратимо ведет к повреждению мозга, миокардит, может развиваться глухота, слепота).

Профилактические прививки проводятся:


детям в возрасте одного года и перед поступлением в школу;

взрослым:

- с 18 до 35 лет (включительно)- не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведения о прививках;
- до 55 лет (включительно)- тем, кто находится в группе риска (работникам медицинских, образовательных организаций, организаций торговли, транспортных компаний, коммунальной, социальной сферы, работникам, работающим вахтовым методом, работникам пропускных пунктов (таможенникам)).

КРАСНУХА - это острая вирусная инфекция, характеризующаяся мелкопятнистой сыпью с увеличением лимфоузлов, невысоким подъемом температуры. Все симптомы – как при ОРВИ, и только через 1-3 дня появляется сыпь. Обычно краснуха у детей протекает легко, но возможно в редких случаях, как и при кори, возникновение энцефалита. **Краснуха очень опасна для беременных женщин**. Если беременная заболевает в первые три месяца, то

18+



РОДИТЕЛЯМ О ПРИВИВКАХ

Уважаемые родители! Вам необходимо знать, что только профилактические прививки могут защитить Вас и Вашего ребенка от серьезных заболеваний.

КОРЬ - острое вирусное инфекционное заболевание, для которого характерно острое начало с повышением температуры до 38°C и выше, обильными выделениями из носа, конъюнктивитом, кашлем, характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов. Корь – одно из самых **контагиозных (заразных)** заболеваний, **передается воздушно-капельным путем**. Заражение происходит даже при мимолетном контакте или вдыхании пыли, содержащей возбудителей. Инфекцию можно «подхватить», проехав в лифте, где находился больной. Недаром корь носит название «подъездной» болезни – удержать ее в пределах одной квартиры крайне сложно.

Опасность кори заключается в возможном развитии постинфекционных осложнений (пневмония, отит, синусит, стоматит, энцефалит, который необратимо ведет к повреждению мозга, миокардит, может развиваться глухота, слепота).

Профилактические прививки проводятся:

детям в возрасте одного года и перед поступлением в школу;

взрослым:

- с 18 до 35 лет (включительно)- не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведения о прививках;
- до 55 лет (включительно)- тем, кто находится в группе риска (работникам медицинских, образовательных организаций, организаций торговли, транспортных компаний, коммунальной, социальной сферы, работникам, работающим вахтовым методом, работникам пропускных пунктов (таможенникам)).

КРАСНУХА - это острая вирусная инфекция, характеризующаяся мелкопятнистой сыпью с увеличением лимфоузлов, невысоким подъемом температуры. Все симптомы – как при ОРВИ, и только через 1-3 дня появляется сыпь. Обычно краснуха у детей протекает легко, но возможно в редких случаях, как и при кори, возникновение энцефалита. **Краснуха очень опасна для беременных женщин**. Если беременная заболевает в первые три месяца, то

беременность может закончиться выкидышем, рождением мертвого ребенка или ребенка с синдромом врожденной краснухи (поражение мозга, врожденный порок сердца, слепота, глухота и др.). Поэтому все женщины детородного возраста должны быть защищены от краснухи, т.е. привиты.



В соответствии с национальным календарем профилактических прививок вакцинацию от краснухи **делают детям в 1 год и 6 лет (включительно), женщинам от 18 до 25 лет (включительно)**, не болевшим, не привитым, привитым однократно против краснухи, не имеющим сведений о прививках против краснухи. **Прививку от краснухи необходимо сделать за 3 месяца до планируемой беременности.**

ДИФТЕРИЯ - тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое дифтерийной палочкой, которая находится в каплях слюны и мокроты больного или бактерионосителя. Возможно заражение через разные предметы и пыль. Непривитые болеют в любом возрасте. Основным проявлением являются тяжелая ангина и общая реакция организма (интоксикация) с поражением сердца, почек, нервной системы. У маленьких детей нередко возникают пленки на голосовых связках, развивается поражение гортани (круп) с резким затруднением дыхания, что может закончиться удушьем и смертью при отсутствии своевременной медицинской помощи. **Курс первичной вакцинации проводится детям с 3-х месячного возраста вакциной АКДС; ревакцинация (дополнительная прививка для закрепления иммунитета) в 18 месяцев, в 7 и в 14 лет.**

ПОМНИТЕ! Взрослым от 18 лет и старше – проводится ревакцинация вакциной АДС-М **каждые 10 лет** от момента последней ревакцинации. Особенно это касается людей пожилого возраста.

ПОЛИОМИЕЛИТ – это острая вирусная инфекция, заражение которой чаще всего происходит через «грязные руки», предметы обихода, воду, пищу, реже – воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Вирус полиомиелита поражает нервную систему человека. После заражения в одном из 200 случаев развивается частичный или полный паралич мышц (чаще нижних конечностей) временного или постоянного характера. Заболевший полиомиелитом может остаться инвалидом на всю жизнь. При поражении головного мозга возможен смертельный исход из-за остановки дыхания и сердечной деятельности. Восприимчивость людей к вирусу полиомиелита высокая. Основную долю заболевших полиомиелитом во всем мире составляют дети до 5 лет, что связано с недостаточно развитыми навыками личной гигиены.

Специфического лечения против полиомиелита не существует. **Единственный способ защиты – прививка!** Ребенка прививают одновременно с АКДС 4 раза инактивированной (убитой) вакциной, а вторая и третья ревакцинации против полиомиелита проводится детям в 20 месяцев и в 6 лет вакциной для профилактики полиомиелита (живой).

Отказ родителей от вакцинации нарушает право ребенка на жизнь и здоровье!

беременность может закончиться выкидышем, рождением мертвого ребенка или ребенка с синдромом врожденной краснухи (поражение мозга, врожденный порок сердца, слепота, глухота и др.). Поэтому все женщины детородного возраста должны быть защищены от краснухи, т.е. привиты.



В соответствии с национальным календарем профилактических прививок вакцинацию от краснухи **делают детям в 1 год и 6 лет (включительно), женщинам от 18 до 25 лет (включительно)**, не болевшим, не привитым, привитым однократно против краснухи, не имеющим сведений о прививках против краснухи. **Прививку от краснухи необходимо сделать за 3 месяца до планируемой беременности.**

ДИФТЕРИЯ - тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое дифтерийной палочкой, которая находится в каплях слюны и мокроты больного или бактерионосителя. Возможно заражение через разные предметы и пыль. Непривитые болеют в любом возрасте. Основным проявлением являются тяжелая ангина и общая реакция организма (интоксикация) с поражением сердца, почек, нервной системы. У маленьких детей нередко возникают пленки на голосовых связках, развивается поражение гортани (круп) с резким затруднением дыхания, что может закончиться удушьем и смертью при отсутствии своевременной медицинской помощи. **Курс первичной вакцинации проводится детям с 3-х месячного возраста вакциной АКДС; ревакцинация (дополнительная прививка для закрепления иммунитета) в 18 месяцев, в 7 и в 14 лет.**

ПОМНИТЕ! Взрослым от 18 лет и старше – проводится ревакцинация вакциной АДС-М **каждые 10 лет** от момента последней ревакцинации. Особенно это касается людей пожилого возраста.

ПОЛИОМИЕЛИТ – это острая вирусная инфекция, заражение которой чаще всего происходит через «грязные руки», предметы обихода, воду, пищу, реже – воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем. Вирус полиомиелита поражает нервную систему человека. После заражения в одном из 200 случаев развивается частичный или полный паралич мышц (чаще нижних конечностей) временного или постоянного характера. Заболевший полиомиелитом может остаться инвалидом на всю жизнь. При поражении головного мозга возможен смертельный исход из-за остановки дыхания и сердечной деятельности. Восприимчивость людей к вирусу полиомиелита высокая. Основную долю заболевших полиомиелитом во всем мире составляют дети до 5 лет, что связано с недостаточно развитыми навыками личной гигиены.

Специфического лечения против полиомиелита не существует. **Единственный способ защиты – прививка!** Ребенка прививают одновременно с АКДС 4 раза инактивированной (убитой) вакциной, а вторая и третья ревакцинации против полиомиелита проводится детям в 20 месяцев и в 6 лет вакциной для профилактики полиомиелита (живой).

Отказ родителей от вакцинации нарушает право ребенка на жизнь и здоровье!